

REP'CLAC® Gibier ⊕

Mode opératoire

RÉPULSIF CONCENTRÉ (à action gustative)

Protection des cultures contre les attaques de lapins, lièvres et cervidés

CARACTÉRISTIQUES

Produit répulsif à base de composants d'origine naturelle (huile de poisson et pipérine).

UTILISATION: phytosanitaire

Protection des cultures contre les dégâts de gibier par badigeonnage des troncs ou par pulvérisation sur végétation.

DOSES

• Protection par badigeonnage des troncs

Préparer un badigeon avec 1 L de Rep'clac Gibier ⊕ dans 2 L d'eau, appliquer sur les troncs avec un pulvérisateur à dos ou manuel. 1 L de Rep'clac Gibier ⊕ permet de badigeonner de 100 à 500 plants suivant hauteur des troncs à protéger et leur diamètre.

• Protection par pulvérisation à la reprise de la végétation

Préparer 1 litre de Rep'clac Gibier ⊕ dans 10 L d'eau, pulvériser sur la totalité des extrémités des plants.

• Protection par pulvérisation de la culture


Préparer une bouillie en mélangeant 3 L de Rep'clac Gibier ⊕ dans 100 L d'eau par hectare. Le traitement d'une bande de 10-20 m en bordure de parcelle peut être suffisant.

DURÉE DE PROTECTION

La durée de protection est de 3 à 5 semaines, elle peut varier selon la vitesse de croissance de la culture. Le plus souvent, un seul traitement au départ de la végétation est suffisant pour protéger la culture. Une fois sec, Rep'clac Gibier ⊕ a relativement une bonne résistance à la pluie.


TRAITEMENT PRÉVENTIF

Une bande d'environ 5-10 m sur le périmètre de la parcelle, avec la dilution de 1 L pour 30 L d'eau peut être envisagée.



Application PAR PULVÉRISATEUR (jeunes plants)

Dilution : suivant moyen appliqué réduire au maximum la quantité d'eau utilisée.



N° AMM : 2110009 sous le nom stop gibier plus détenu par la société Morpheus 79 330 SAINT-VARENT.




PROTECTA sas • F 84250 Le Thor
Tél. 04 90 02 16 20 • Fax 04 90 33 73 90 • contact@an-protecta.eu • www.an-protecta.eu

REP'CLAC® Gibier ⊕

Application du répulsif REP'CLAC® Gibier ⊕


CONTRE LAPINS ET LIÈVRES

Traiter ≈ 10 m sur le pourtour de la parcelle à protéger (ou sur les côtés où habituellement ils font des dégâts).



CONTRE CHEVREUILS

- Si présence de fil de palissage :
2 rangées sur le pourtour et 8-10 m en entrée de rangée.
- Avec passage transversal possible :
10 m sur le pourtour.



 Zone à traiter au pulvérisateur/atomiseur

Dosage : 3 litres de REP'CLAC Gibier ⊕ pour 100 litres d'eau/hectare, une meilleure persistance peut être obtenue avec 5 litres/hectare (+ 1 semaine)

NB : attention les fortes chaleurs (au-dessus de 25/30°C au soleil) peuvent altérer la durée d'efficacité du Rep'clac gibier !