

Notice d'utilisation PROCEREX PIÈGE

Piégeage massif et de détection de la processionnaire du pin (*Thaumetopoea pityocampa*)

FONCTIONNEMENT

Une capsule de phéromone de grande efficacité d'attraction est placée sous le couvercle dans la chambre à phéromone. La capsule PROCEREX a une durée d'attraction minimale de 9 semaines. Elle attire, les papillons mâles vers l'intérieur du piège, d'où ils ne sortent plus (chicanes et présence éventuelle d'eau).

POSITIONNEMENT

Le piège PROCEREX se positionne à 1,50 m voire plus haut, quand cela est possible !

DENSITÉ du POSITIONNEMENT

- a) Forêt de pin : 6 à 7 pièges par hectare !
- b) Bosquet de pin : environ 1 piège réparti tous les 20 m avec un nombre minimum de 4 pièges, à positionner autour du bosquet (s'il s'agit d'une dizaine d'arbres maxi, sinon tous les 20 m).

DÉTECTION

Lorsque le piège est utilisé pour détecter la présence de la processionnaire du pin, un à trois pièges par hectare sont suffisants.

Dans tous les cas, les pièges doivent être installés de façon à ce que les papillons mâles ne soient pas gênés par les branches pour entrer dans le piège.

CHRONOLOGIE

Le piège est à mettre en place dès le début du vol des papillons entre le 20 juin (en altitude ou latitude nord) et le 10 juillet (régions côtières Méditerranée) pour une récupération de mi-septembre à fin septembre (le vol se termine plus tôt sur les secteurs les plus précoces et inversement).

CONSEIL D'UTILISATION

Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de lester le piège avec environ 1 litre d'eau + 5 cl environ d'huile, afin d'améliorer les captures tout en limitant l'évaporation pendant les 2 mois d'exposition. Si le remplissage en eau devait poser un problème, utilisez du sable ou de la terre pour effectuer ce lest. Ce lest évitera, que le piège ne frotte trop contre des branches voisines, qui risqueraient de percer la poche du sac et stabilise le piège.

CONSERVATION DES PHÉROMONES

La capsule de phéromone, doit être stockée au frais (réfrigérateur) lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans ce cas, elle peut être conservée pendant une durée supérieure ou égale à 18 mois !

