

PHYTOPAST G



DEFINITION

- Mastic souple **à greffer et à cicatriser**

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

- Flacon applicateur 250g : carton de 12 unités.
- Pot de 400g : carton de 12.
- Pot de 1 kg : carton de 12.
- Seau de 5 kg : unitaire.

DESCRIPTION

- Mastic souple, de couleur « kaki » pour le traitement général des voies aériennes de pénétration.
- Comportant des résines de synthèse, des huiles végétales et des terpènes de pin et sapin.
- Assurant une barrière mécanique destinée à la protection des plaies de taille et à faciliter une cicatrisation rapide en greffage ou surgreffage.

MODES D'EMPLOI

- Utilisation directe au pinceau sans aucune préparation préalable.
- Peut se diluer dans 3 - 5% d'eau pour faciliter le traitement rapide des plaies de rabattage avant greffage ou en cas de perte de viscosité.
- PHYTOPAST G doit être appliqué immédiatement après la taille ou le curetage des chancres : la barrière physique préventive obtenue sur des plaies fraîches empêchera la pénétration de nombreux champignons et leur colonisation des tissus végétaux profonds.

AVANTAGES

- Très facile d'application: le mastic s'emploie à froid et reste souple (thermostable).
- Sans préparation, puisque prêt à l'emploi !
- Polyvalence d'usages : cicatrisation des plaies, greffage et surgreffage.
- Sa composition unique facilite la formation du bourrelet cicatriciel.
- Ne coule pas lors de l'application sur des plaies verticales.
- Viscosité constante à partir de 1°C (thermostable).
- Un taux de reprise des greffons étonnant !
- Sans classement toxicologique. Durée de la protection mécanique : 2 – 4 mois (surgreffage) jusqu'à 12 mois si appliqué sur plaies de taille !

PRECAUTIONS :

- Stocker le mastic à l'abri du gel.
- Appliquer par temps non pluvieux : un laps de temps de 24 heures sans pluie environ est nécessaire pour une bonne résistance au lessivage..

PRECONISATIONS D'EMPLOI

Précautions à prendre pour le traitement des chancres :

- Cureter soigneusement la plaie en éliminant les parties mortes ou atteintes par la maladie.
- Lorsque le support est rendu sain, appliquer sur la plaie une couche de PHYTOPAST G au pinceau, en n'hésitant pas à déborder sur l'écorce.